



# 麻疹風しん予防接種は 済みましたか？

はしか(麻疹)は感染力が非常に強い感染症です。  
かかった場合は対症療法しかありません。  
予防にはワクチン接種が非常に有効です。

【次の生年月日の方が対象です】

平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ

【無料で受けられる期間】

令和2年4月1日～**令和3年3月31日まで**

(麻疹風しんの定期予防接種は、乳幼児期に1回と小学校就学前に1回の2回接種です)

【接種できる場所】

横浜市内の予防接種協力医療機関※1です。事前に予約等の確認をしてください。

【持参するもの】 次の3点を持参してください。

- 「母子健康手帳」 (お子様の接種歴が確認できるもの) ※2
- 「健康保険証」 (お子様の生年月日と住所が確認できるもの)
- 「予診票(接種券)」 (横浜市発行) ※3

※1 予防接種協力医療機関については、横浜市ホームページをご覧ください。下記のお問い合わせ先におたずねください。

※2 「母子健康手帳」をお持ちでない場合は、予防接種協力医療機関に「お子様の接種歴」を口頭でお伝えいただき、接種前にご相談ください。

※3 「予診票(接種券)」は、対象者の方へ令和2年3月末頃に個別通知にてお送りしています。

横浜市外から転入された方や紛失等で お手元に予診票がない場合は、「横浜市予防接種コールセンター」にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

**横浜市予防接種  
コールセンター**

**TEL 045-330-8561**

横浜市予防接種コールセンター  
(電話→平日 9:00～17:00  
土日祝日・年末年始除く)

予防接種のスケジュールや  
個別通知(案内)の送付など

FAX: 045-664-7296

・横浜市ホームページ:

<http://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/yobosesshu/vaccination.html>

または 横浜市予防接種で



麻疹・風しんってどんな病気? など → くわしくは裏面へ

# 麻疹風しん予防接種 Q&A

## Q1. 麻疹（はしか）って、どんな病気？（麻疹：Measles）

麻疹（はしか）は、とてもうつりやすい病気です。麻疹（はしか）は、麻疹ウイルスの空気感染（飛沫感染・接触感染）によって発症します。主な症状は、発熱、せき、鼻汁、めやに、赤い発しんです。38℃前後の熱やせき、鼻汁などが2～3日続いてから、高熱とともに赤い発しんが出現します。合併症を引き起こすことが30%程度あり、主な合併症には、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎などがあります。また、麻疹にかかると数年から10数年経過した後に亜急性硬化性全脳炎（SSPE）という重い脳炎を発症することがあります。

## Q2. 風しんって、どんな病気？（風しん：Rubella）

風しんは、風しんウイルスの飛沫感染によって発症します。麻疹より淡い色の赤い発しん、発熱、首のうしろのリンパ節が腫れるなどが主な症状として現れます。合併症として関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎などが報告されています。

妊娠中の女性が風しんに感染すると、お腹の赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、心臓に異常があるといった「先天性風しん症候群」になる可能性があります。

## Q3. 麻疹風しん予防接種の接種歴は、どこに載っているの？

母子健康手帳にある「予防接種の記録」（後ろの方のページ）で確認してください。

母子健康手帳によっては、「麻疹」と「風しん」の欄が別々に記載されているもの（※1）や、「麻疹風しん混合（MR）」と記載されているもの（※2）があります。



※1

予防接種の記録 Immunization Record				
ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (歳 か月)	メーカー/ロット Manufac- turer / Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
麻疹（はしか） Measles				
風しん（三日はしか） Rubella				



※2

または 予防接種の記録 Immunization Record				
ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (歳 か月)	メーカー/ロット Manufac- turer / Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
麻疹（はしか） Measles	第1期			
風しん（三日はしか） Rubella	第2期			
混合				

## Q4. 接種の記録を確認したら、「麻疹単独ワクチン」と「風しん単独ワクチン」をそれぞれ1回ずつ接種しているから、今回は接種しなくていいの？

「麻疹単独ワクチン」と「風しん単独ワクチン」をそれぞれ1回ずつ接種している場合でも、2回目の接種（今回）は必要です。ただし、それぞれ2回目の接種を既に行っている場合、改めて接種する必要はありません。

「麻疹風しん混合ワクチン（MR）」の接種は、「麻疹単独ワクチン」・「風しん単独ワクチン」をそれぞれ1回接種したのと同じです。